

הנדון: ברילינטה, 90 מ"ג, טבליות

אדון/גברת נכבד/ה שלום,
לבקשתך מצורפים פרטי הזכאות לערך עבורו ביקשת לבצע בדיקה באתר "כל הבריאות" - אתר הזכויות הרפואיות של משרד הבריאות. המידע באתר "כל הבריאות", כפי שמופיע במסמך המצורף, נועד לתת תמונה עדכנית ומדויקת ככל הניתן ביחס לזכויות המבוטח. עם זאת, זהו תוכן כללי שלא מותאם בהכרח לכל המצבים הרפואיים ומאפייניהם.
לקבלת השירות הרפואי / תרופה, יש לפנות לקופת החולים שלך או למשרד הבריאות (בהתאם לגורם האחראי למתן השירות, כפי שמפורט במסמך). בכל שאלה ניתן לפנות למשרד הבריאות בטלפון *5400, או באמצעות "צור קשר" באתר "כל הבריאות".

כלית: סל בריאות ממלכתי - נכלל בתוכנית

השתתפות עצמית:

תנאים והגבלות:

א. התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה:

1. מניעת אירועים אחרותרומבטיים בחולים עם תסמונת כלילית חריפה (ACS) לאחר צנתור לב טיפולי, אשר פיתחו stent thrombosis תחת טיפול ב- Clopidogrel בתוך שנה מהצנתור. משך הטיפול בתכשיר לא יעלה על 12 חודשים.
 2. מניעת אירועים אחרותרומבטיים בחולים עם תסמונת כלילית חריפה (ACS) עם או ללא עליה במקטע ST, לאחר צנתור לב אבחנתי ללא התערבות, עם טרופונין חיובי ובעלי עדות נוכחית או קודמת למחלה כלילית טרשתית. משך הטיפול בתכשיר לא יעלה על 12 חודשים.
 3. מניעת אירועים אחרותרומבטיים בחולים עם (ST STEMI) segment elevation myocardial infarction לאחר צנתור לב. משך הטיפול בתכשיר לא יעלה על 12 חודשים.
 4. מניעת אירועים אחרותרומבטיים – עבור חולי ACS ללא עליית מקטע ST (חולי NSTEMI או תעוקת חזה בלתי יציבה) עם טרופונין חיובי העוברים PCI עם השתלת תומך. משך הטיפול בתכשיר לא יעלה על 12 חודשים.
- ב. הטיפול בתרופה לא יינתן בשילוב עם CLOPIDOGREL או PRASUGREL.
- ג. בכל מקרה משך הטיפול ב-TICAGRELOR ו/או PRASUGREL לא יעלה על 12 חודשים לכל התוויה.
- חולים המצויים באחת מקבוצות הסיכון האיטכמי המוגבר (לעניין זה - מחלה כלילית רב כלית, סוכרתיים, רקע של שני התקפי לב ומעלה) ואינם בעלי גורמי סיכון לדמם, יהיו זכאים ל-12 חודשי טיפול נוספים מעבר לאמור לעיל.

מכבי: סל בריאות ממלכתי - נכלל בתוכנית

השתתפות עצמית:

תנאים והגבלות:

א. התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה:

1. מניעת אירועים אחרותרומבטיים בחולים עם תסמונת כלילית חריפה (ACS) לאחר צנתור לב טיפולי, אשר פיתחו stent thrombosis תחת טיפול ב- Clopidogrel בתוך שנה מהצנתור. משך הטיפול בתכשיר לא יעלה על 12 חודשים.
 2. מניעת אירועים אחרותרומבטיים בחולים עם תסמונת כלילית חריפה (ACS) עם או ללא עליה במקטע ST, לאחר צנתור לב אבחנתי ללא התערבות, עם טרופונין חיובי ובעלי עדות נוכחית או קודמת למחלה כלילית טרשתית. משך הטיפול בתכשיר לא יעלה על 12 חודשים.
 3. מניעת אירועים אחרותרומבטיים בחולים עם (ST STEMI) segment elevation myocardial infarction לאחר צנתור לב. משך הטיפול בתכשיר לא יעלה על 12 חודשים.
 4. מניעת אירועים אחרותרומבטיים – עבור חולי ACS ללא עליית מקטע ST (חולי NSTEMI או תעוקת חזה בלתי יציבה) עם טרופונין חיובי העוברים PCI עם השתלת תומך. משך הטיפול בתכשיר לא יעלה על 12 חודשים.
- ב. הטיפול בתרופה לא יינתן בשילוב עם CLOPIDOGREL או PRASUGREL.
- ג. בכל מקרה משך הטיפול ב-TICAGRELOR ו/או PRASUGREL לא יעלה על 12 חודשים לכל התוויה.
- חולים המצויים באחת מקבוצות הסיכון האיטכמי המוגבר (לעניין זה - מחלה כלילית רב כלית, סוכרתיים, רקע של שני התקפי לב ומעלה) ואינם בעלי גורמי סיכון לדמם, יהיו זכאים ל-12 חודשי טיפול נוספים מעבר לאמור לעיל.

מאוחדת: סל בריאות ממלכתי - נכלל בתוכנית

השתתפות עצמית:

1. מניעת אירועים אחרותרומבוטיים בחולים עם תסמונת כלילית חריפה (ACS) לאחר צנתור לב טיפולי, אשר פיתחו stent thrombosis תחת טיפול ב- Clopidogrel בתוך שנה מהצנתור. משך הטיפול בתכשיר לא יעלה על 12 חודשים.
2. מניעת אירועים אחרותרומבוטיים בחולים עם תסמונת כלילית חריפה (ACS) עם או ללא עליה במקטע ST, לאחר צנתור לב אבחנתי ללא התערבות, עם טרופונין חיובי ובעלי עדות נוכחית או קודמת למחלה כלילית טרשתית. משך הטיפול בתכשיר לא יעלה על 12 חודשים.
3. מניעת אירועים אחרותרומבוטיים בחולים עם (ST STEMI) segment elevation myocardial infarction לאחר צנתור לב. משך הטיפול בתכשיר לא יעלה על 12 חודשים.
4. מניעת אירועים אחרותרומבוטיים – עבור חולי ACS ללא עליית מקטע ST (חולי NSTEMI או תעוקת חזה בלתי יציבה) עם טרופונין חיובי העוברים PCI עם השתלת תומך. משך הטיפול בתכשיר לא יעלה על 12 חודשים.
- ב. הטיפול בתרופה לא יינתן בשילוב עם CLOPIDOGREL או PRASUGREL.
- ג. בכל מקרה משך הטיפול ב-TICAGRELOR ו/או PRASUGREL לא יעלה על 12 חודשים לכל התוויה. חולים המצויים באחת מקבוצות הסיכון האיסקמי המוגבר (לעניין זה - מחלה כלילית רב כלית, סוכרתיים, רקע של שני התקפי לב ומעלה) ואינם בעלי גורמי סיכון לדמם, יהיו זכאים ל-12 חודשי טיפול נוספים מעבר לאמור לעיל.

לאומית: סל בריאות ממלכתי - נכלל בתוכנית

השתתפות עצמית:

תנאים והגבלות:

א. התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה:

1. מניעת אירועים אחרותרומבוטיים בחולים עם תסמונת כלילית חריפה (ACS) לאחר צנתור לב טיפולי, אשר פיתחו stent thrombosis תחת טיפול ב- Clopidogrel בתוך שנה מהצנתור. משך הטיפול בתכשיר לא יעלה על 12 חודשים.
2. מניעת אירועים אחרותרומבוטיים בחולים עם תסמונת כלילית חריפה (ACS) עם או ללא עליה במקטע ST, לאחר צנתור לב אבחנתי ללא התערבות, עם טרופונין חיובי ובעלי עדות נוכחית או קודמת למחלה כלילית טרשתית. משך הטיפול בתכשיר לא יעלה על 12 חודשים.
3. מניעת אירועים אחרותרומבוטיים בחולים עם (ST STEMI) segment elevation myocardial infarction לאחר צנתור לב. משך הטיפול בתכשיר לא יעלה על 12 חודשים.
4. מניעת אירועים אחרותרומבוטיים – עבור חולי ACS ללא עליית מקטע ST (חולי NSTEMI או תעוקת חזה בלתי יציבה) עם טרופונין חיובי העוברים PCI עם השתלת תומך. משך הטיפול בתכשיר לא יעלה על 12 חודשים.
- ב. הטיפול בתרופה לא יינתן בשילוב עם CLOPIDOGREL או PRASUGREL.
- ג. בכל מקרה משך הטיפול ב-TICAGRELOR ו/או PRASUGREL לא יעלה על 12 חודשים לכל התוויה. חולים המצויים באחת מקבוצות הסיכון האיסקמי המוגבר (לעניין זה - מחלה כלילית רב כלית, סוכרתיים, רקע של שני התקפי לב ומעלה) ואינם בעלי גורמי סיכון לדמם, יהיו זכאים ל-12 חודשי טיפול נוספים מעבר לאמור לעיל.

הערה

- תושב מדינת ישראל זכאי לשירותים הכלולים בסל הבריאות כמוגדר בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד - 1994, ובכפוף לכלל תנאי החוק.
- התרופה מופיעה באתר זה בשמה המסחרי. הקופה לא מחויבת לספק דווקא את אותה גרסה של חומר פעיל המופיעה באתר זה בשמה המסחרי ויכולה לספק גרסאות מסחריות ("חלופות גנריות") אחרות שלה - כל זאת בכפוף לשיקול דעת רפואי נאות.
- קיימות זכויות לפטורים, הנחות ותקרות השתתפות עצמית לפי הכללים הבאים:
- [פטור מהשתתפות עצמית עבור תרופות](#)
- [הנחות עבור תרופות](#)
- [תקרת השתתפות עצמית לחולים המוגדרים כחולים כרוניים](#)
- מידע נוסף ניתן למצוא בדף "[זכויות מיוחדות](#)".

הכללה בסל הבריאות

מתאריך: 10/01/2012

חוזרי משרד הבריאות

- [חוזר המנהל הכללי מס' 3/2020 - הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2020](#)
- [חוזר המנהל הכללי מס' 2/2016 - הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2016](#)
- [חוזר מנהל הרפואה מס' 2/2016 - הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2016](#)

מידע מקצועי וטכני

סוג: תרופה

תחום רפואי:

מיועד למצב רפואי

אירועים אחרותרומבוטיים בחולים עם תסמונת כלילית חריפה (ACS) לאחר צנתור לב טיפולי
אירועים אחרותרומבוטיים בחולים עם (ST segment elevation myocardial infarction) (STEMI) לאחר צנתור לב.



בברכה,
"כל הבריות"
האגף לפיקוח על קופות החולים והשב"ן
משרד הבריות